

Affaire suivie par : **Docteur Dominique LE GOFF**
Courriel : dominique.legoff@ars.sante.fr
Téléphone : **02.98.64.01.58**

**NOTE D'INFORMATION RELATIVE À LA ROUGEOLE
FAMILLES et PERSONNELS des ETABLISSEMENTS d'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE**

Une épidémie de rougeole sévit actuellement en Nouvelle Aquitaine. Il existe un risque élevé de diffusion de cette épidémie à l'ensemble du territoire français. Quelques cas ont été déclarés en Bretagne depuis début février.

La rougeole est une infection virale très contagieuse qui se manifeste par de la fièvre, de la toux, un rhume, une conjonctivite et des taches rouges sur la peau (éruption) qui débutent au niveau de la tête et s'étendent vers le bas du corps en 3 jours. L'éruption débute 7 à 18 jours après le contact avec un malade (en moyenne 14 jours).

La période de contagiosité du malade débute 5 jours avant l'éruption et se poursuit jusqu'à 5 jours après. Pour les malades, l'éviction doit être maintenue **pendant 5 jours après le début de l'éruption**.

Dans ce contexte, la mise à jour de la vaccination contre la rougeole est fortement recommandée:

- Toutes les personnes nées depuis 1980 et âgées de plus de 18 mois sans antécédent de rougeole doivent avoir reçu **2 doses de vaccin** Rougeole/Oreillons/Rubéole pour être protégées (celles qui n'ont jamais été vaccinées doivent recevoir 2 injections séparées d'au moins 1 mois d'intervalle, celles qui n'auraient reçu qu'une seule dose doivent avoir une 2^e dose).
- Le calendrier vaccinal en vigueur actuellement prévoit une dose du vaccin Rougeole/Oreillons/Rubéole à l'âge de 12 mois et une seconde dose entre 16 et 18 mois.

Vérifiez dans les carnets de santé ou avec votre médecin traitant que vos enfants, âgés entre 12 et 16 mois ont bien reçu une dose de vaccin, âgés de 16 mois ou plus ont bien reçu 2 doses de vaccin, dans ce cas, ils sont à jour !

Les noms des vaccins contre la rougeole pouvant figurer sur les carnets de santé sont :

- Le **ROUVAX**, vaccin monovalent (uniquement rougeole)
- Ou en association avec des vaccins contre la rubéole et les oreillons :
 - **ROR vax** (plus commercialisé depuis 2008)
 - **MMR Vax Pro**
 - **PRIORIX**

Pour les personnels en contact avec les enfants deux doses de vaccin contre la rougeole sont recommandées au calendrier vaccinal pour ceux nés depuis 1980, sans antécédent connu de rougeole, et une dose de vaccin pour ceux nés avant 1980. Pour ceux dont les antécédents de vaccination ou de maladie sont incertains, une dose de vaccin peut-être administrée.

La vaccination contre la rougeole est contre-indiquée pendant la grossesse, en cas d'immunosuppression ou de prise d'un traitement immunosuppresseur ou de corticoïdes au long cours.

Les malades de moins d'un an et de plus de 20 ans peuvent présenter des formes plus sévères. Il est recommandé de ne pas exposer les nourrissons dans l'entourage d'un cas possible de rougeole